

Nazwa scenariusza	Przygotowanie zestawu do paracentezy-asystowanie lekarzowi.
Cele	<p>Cel główny: Przygotowanie jałowego sprzętu do punkcji jamy brzusznej.</p> <p>Cele szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wskazania diagnostyczne i lecznicze punkcji jamy otrzewnej, -procedura przygotowania jałowego zestawu, -asystowanie lekarzowi podczas zabiegu, -powikłania spowodowane nieprzestrzeganiem.
Opis scenariusza	<p>Symulator leżący w gabinecie zabiegowym na kozetce, z odsłoniętą okolicą jamy brzusznej.</p> <p>Obok stoi stolik zabiegowy z blatem.</p> <p>Student ma wykonać procedurę otworzenia jałowego zestawu, przygotowaniu środka znieczulającego do znieczulenia nasiękowego z 1% lub 2% Lignocainy, przestrzegając obowiązujących zasad aseptyki i bhp w pracy pielęgniarzkiej.</p> <p>Stosowana metoda- 4 kroków vs Dla każdego studenta jest przygotowany zestaw sprzętu- trenażerów Stosowana metoda- Practice by watching</p>
Wyposażenie/ wykaz sprzętu dla technika do przygotowania	<ul style="list-style-type: none"> -symulator z imitacją wodobrzusza, z wyznaczonym miejscem wkłucia (gdzie opukiwanie wskazuje na obecność płynu, najlepiej w linii pośrodkowej 2–3 cm poniżej pępka lub w 1/3 dolnej linii łączącej kołec biodrowy przedni górny z pępkiem po stronie lewej, rzadziej po prawej) -trenażery z wyznaczonym miejscem wkłucia j/w -stolik zabiegowy lub taca -1% lub 2% amp. Lignocainy -igły 0,7 oraz 0,5 -strzykawki 5ml, 10ml -środek dezynfekujący Octancept -zestaw do nakłucia: -cewnik (kaniula): 20 G (różowy, Ø 1,0 mm), 18 G (zielony, Ø 1,2 mm), - specjalny zestaw do paracentezy - kranik trójdrożny, -dren jak do wlewu kroplowego - butelka do gromadzenia płynu (jeśli nie używasz specjalnego zestawu do paracentezy). -opatrunki jałowe -venaplast - przylepiec włókninowy ELASTOPOR 10 cm x 10 m -nożyczki -serweta jałowa -pinseta jałowa -gaziki jałowe 5x5 -gaziki jałowe 7,5x7,5 -pojemnik twardościenny -rękawiczki niejałowe rozmiar S,L -rękawiczki jałowe, rozmiar: S,L -worek czerwony na odpady skażone medyczne

Informacje dla technika jak rozstawić sprzęt (rysunek)	Symulator leżący w gabinecie zabiegowym na kozetce, z odsłoniętą okolicą jamy brzusznej, z wyznaczonym miejscem wkłucia (gdzie opukiwanie wskazuje na obecność płynu, najlepiej w linii pośrodkowej 2–3 cm poniżej pępka lub w 1/3 dolnej linii łączącej kołec biodrowy przedni górny z pępkiem po stronie lewej, rzadziej po prawej). Obok stoi stolik zabiegowy z blatem.
Przebieg scenariusza	<p>Kolejność wykonywanych czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etap przygotowawczy: -skompletowanie zestawu 2. Etap wykonania: -spryskanie Octaniseptem, przygotowanie miejsca wkłucia pacjenta -ubranie jałowych rękawiczek -otworzenie i przygotowanie jałowego zestawu do nakłucia, zmontowanie zestawu -nabranie środka znieczulającego Lignocainy wg zlecenia lekarskiego- jałowe podanie lekarzowi -jałowe podanie igły do nakłucia z zmontowanym zestawem -obserwacja ilości ewakuowanego płynu -zabezpieczenie miejsca wkłucia jałowym opatrunkiem 3. Etap porządkowania: -segregacja odpadów medycznych <p>Czas wykonania zadania: 15 min. Checklista przekazana studentom.</p>
Informacja dla studenta	Na oddziale internistycznym przebywa pacjent z wodobrzuszem. Dzisiejszego dnia będzie wykonywany zabieg paracentezy. Przygotuj zestaw do nakłucia jamy otrzewnej wraz ze środkiem znieczulającym.
Kwestie do omówienia (Podsumowanie po ćwiczeniu)	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie pacjenta do zabiegu - znaczenie skompletowania jałowego zestawu w przypadku braku na oddziale specjalnego zestawu do paracentezy - sposoby asystowania lekarzowi przy nakłuciu jamy otrzewnej - obserwacja odbarczanego płynu - omówienie tzw. punktów krytycznych - sposoby jałowego zabezpieczenia miejsca wkłucia