

Tytuł scenariusza	ZA MGŁĄ	
Główny problem medyczny	1. Zatrucie alkoholowe	
Cele scenariusza – do dyskusji przy debriefingu	1. Komunikacja w zespole. 2. Organizacja pracy w zespole. 3. Asertywność we współpracy z lekarzem dyżurnym (uzyskanie zlecenia lekarskiego na podanie 500ml glucosum 5%, 500ml 0,9% NaCl, pobranie krwi). 4. Wykonanie wpłukania żołądka.	
Opis przypadku	Na SOR trafia 20-letnia pacjentka, Pani Kinga, która została przyprowadzona przez koleżankę, Panią Milenę. Obie były na tej samej imprezie, na której piły alkohol. Kolega dziewczyn poczęstował Panią Kingę nalewką swojego wujka. Ok godziny 22:00 zaczęła się bardzo źle czuć. Pani Milena zabrała ją na izbę przyjęć.	
Skład zespołu (osoby uczestniczące w scenariuszu)	Personel ICSM: Zespół pielęgniarstwa 3 studentów - Instruktor – student, który wpada na SOR, pyta co się stało, miota się, wprowadza chaos, zleca podanie 500ml glucosum 5%, 500ml 0,9% NaCl, pobranie krwi, zmierzenie glikemii, płukanie żołądka - studentka – koleżanka Milena, bardzo chaotyczna, przerażona, trudno uzyskać od niej informacje, boi się o koleżankę, prosi żeby nie wzywać policji, nie chce zostawić koleżanki samej, panikuje, krzyczy, wprowadza dużo zamieszania.	Grupa docelowa – studenci I, II, III PIS, mgr
Informacja wstępna dla uczestników	Na SOR trafia 20-letnia pacjentka, Pani Kinga, która została przyprowadzona przez koleżankę, Panią Milenę. Ok godziny 22:00 zaczęła się bardzo źle czuć.	
Przygotowanie manekina/pacjenta symulowanego (ubiór)	— SOR — symulator osoby dorosłej, kobiety — symulator ubrany spodnie, bluzkę, leży na łóżku na SOR, bez przykrycia	
Miejsce akcji	Godz. 22:30, SOR	
Wstępne parametry symulatora (manekina)	Kobieta spleciona, ograniczony kontakt, nielogiczna, senna 25 oddechów/min; przyspieszony oddech, SpO2 – 96% Temp. 35,6°C RR: 140/90mmHg HR: 100/min	
Wywiad	S – kobieta nieprzytomna	
	A – brak informacji	
	M – brak informacji	
	P – brak informacji	
	L – dwa kawałki pizzy dwie godziny wcześniej	
Badanie	E – brak zmian	
	A – drogi oddechowe drożne	
	B – Ruchy oddechowe symetryczne, oddech przyspieszony, liczba oddechów: 25/min., pulsoksymetria (SpO2: 96%)	
	C – HR: 100/min, temperatura 35,6 °C, prawidłowe wypełnienie żył szyjnych, RR-	

	140/90
	D –oznaczenie glikemii: 150mg%, brak orientacji allo- i autopsychicznej, napięcie siły mięśniowej osłabione
	E – temperatura ciała 35,6 °C, brak zmian na ciele
Przebieg scenariusza	<p>Zakończenie pozytywne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Studenci oceniają stan pacjentki na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego — Studenci przeprowadzają wywiad z koleżanką pacjentki — Studenci dokonują pomiaru parametrów życiowych (podłączają do kardiomonitora) — Studenci wzywają pomoc, lekarza dyżurnego do konsultacji, który po dopytaniu szczegółów zleca ustnie (nie ma czasu wpisać zlecenia): NaCl 0,9% 500ml iv, Glucosum 5% 500ml, pomiar glikemii, pobranie krwi na badania laboratoryjne (morfologia, biochemia, gazometria, układ krzepnięcia, glukoza, ob.), płukanie żołądka z pobraniem treści do badania — Studenci zakładają wkłucie dożylnie, mierzą glikemię, podłączają płyny — Studenci zapewniają komfort cieplny pacjentce — Studenci organizują swoją pracę przez wyłonienie lidera i podział na role — Studenci egzekwują przyjsie lekarza na SOR, a następnie wypisanie zlecenia lekarskiego <p>Zakończenie negatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> — Studenci nie oceniają stanu pacjentki na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego — Studenci nie przeprowadzają wywiadu z koleżanką pacjentki — Studenci nie dokonują pomiaru parametrów życiowych — Studenci nie konsultują się z lekarzem dyżurnym — Studenci zakładają wkłucie dożylnie, mierzą glikemię, podłączają płyny — Studenci nie zapewniają komfortu cieplnego pacjentce — Studenci nie organizują swojej pracy, panuje chaos, nie wyłaniają lidera — Studenci nie egzekwują przyjsia lekarza na SOR — Studenci wykonują czynności bez pisemnego zlecenia
Koła ratunkowe	Instruktor – pielęgniarka oddziałowa, wchodzi na salę, stanowczo prosi lekarza o zlecenie lekarskie, organizuje pracę w zespole.
Niezbędne rekwizyty	Wózek zabiegowy, karta zleceń lekarskich, zestaw do pobierania krwi, zestaw do wykonania wlewu kroplowego, kardiomonitor, zestaw do pomiaru glikemii
Zalecane postępowanie	Obserwacja pacjentki na SORze